

# ALLEATO 80 WG

FUNGICIDA SISTEMICO IN GRANULI IDRODISPERSIBILI  
(FRAC33)

ALLEATO 80 WG

## COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Fosetil Alluminio puro	g	80
Coformulanti q.b. a	g	100

## Indicazioni di pericolo (EU)

EUH210 - Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta

EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso



Titolare della registrazione:

**HELM AG** – Nordkanalstrasse 28

**D-20097 Hamburg (Germania) – Tel.: 0049 40 2375 0 – www.helmag.com**

Distribuito da:

Belchim Crop Protection Italia S.p.A.

Strada Sei, Palazzo N, Ingresso 3, 20089 Rozzano MI Tel. 02 3359 9422

## Officine di produzione:

SCHIRM GmbH - Mecklenburger Str. 229, D-23568 Lübeck, Germania

STI Solfotecnica Italiana S.p.A. - Via E. Torricelli, 2 - Cotignola (RA)

SBM Formulation - Av. J. Focault, Z.I. - Beziers (Francia)

LIMIN Chemical Co., Ltd. - Xinhua Rd., 221400 Xinyi, Jiangsu Province, Cina

Registrazione del Ministero della Salute n° 11732 del 31/07/2003

Contenuto netto: g 100-250-500-kg 1-1,5-3-5-10-25

Partita n° .....del.....

## Prescrizioni supplementari

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

## INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione informare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

**Avvertenza: Consultare un centro antiveleni**

## CARATTERISTICHE

ALLEATO 80 WG è un fungicida sistemico che penetra rapidamente nei tessuti vegetali muovendosi all'interno della pianta in senso ascendente e discendente, proteggendo tutta la pianta ed anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento. Ha un'attività preventiva e curativa, stimola le difese naturali della pianta scongiurando, vista la velocità di assorbimento, i problemi legati al dilavamento.

Per ottenere un'efficacia ottimale, applicare in fase di attiva crescita ed impiegare a volume normale; per impieghi a volume ridotto, adeguare la concentrazione in modo da distribuire la medesima quantità di principio attivo per ettaro.

**PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA:** Sciogliere la dose consigliata di prodotto in 2/3 di acqua; quindi portare a volume aggiungendo la rimanente acqua occorrente tenendo la miscela in costante agitazione.

## MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO

Cetriolo e Zucchini in serra - contro *Peronospora (Pseudoperonospora cubensis)*

Dose: 4 kg/ha

Si raccomanda la dose ridotta di 1 kg/ha subito dopo il trapianto

Volume d'applicazione: 400 - 2000 l/ha, adeguare per conseguire una buona copertura fogliare

Numero massimo d'applicazioni: 2-4 applicazioni ogni 10-14 giorni dal trapianto

Rispettare la dose massima d'impiego di 8 kg s.a./ha/anno

Vite - contro *Peronospora (Plasmopara viticola)*

Dose: 250 g prodotto /hl

Adeguare il volume d'acqua per conseguire una buona copertura - 1000 l/ha massimo

Numero massimo d'applicazioni: 6 applicazioni, iniziando preventivamente in fase di attiva crescita poi ogni 10-14 giorni

Per ottenere una migliore efficacia si consiglia sempre l'associazione con formulati di copertura in caso di forte pressione della malattia (rame escluso).

Rispettare la dose massima d'impiego di 8 kg s.a./ha/anno

Arancio, Limone, Mandarino, Pompelmo - contro Gommosi (*Phytophthora spp.*)

Dose: 225-300 g prodotto /hl

Adeguare il volume d'acqua per conseguire una buona copertura - 2000 l/ha massimo

Numero massimo d'applicazioni: 4 applicazioni fogliari seguendo la pratica locale

- 2 applicazioni in primavera e 2 applicazioni in autunno con 21-35 giorni tra applicazioni consecutive; Oppure

- 2 applicazioni in autunno-inverno con 21-35 giorni tra applicazioni consecutive

Rispettare la dose massima d'impiego di 8 kg s.a./ha/anno

Melone e Cocomero in campo e serra - contro *Peronospora (Pseudoperonospora cubensis)*

Dose: 2,5-3.0 kg di prodotto/ha. In caso di forte pressione della malattia è consentito un trattamento alla dose massima di 4 kg/ha. Non usare la dose massima nell'ultimo trattamento.

Si raccomanda la dose ridotta 1.0 kg prodotto/ha subito dopo il trapianto

Volume medio d'applicazione: 1000 l/ha, da adeguare per conseguire una buona copertura fogliare

Numero massimo d'applicazioni: 4 applicazioni ogni 10-14 giorni dal trapianto

Rispettare la dose massima d'impiego di 8 kg s.a./ha/anno

Lattughe e simili in campo e serra - contro *Peronospora (Bremia lactucae)*

Dose: 2.0-3.0 kg prodotto/ha

Volume d'applicazione: 1000 - 1500 l/ha, adeguare per conseguire una buona copertura fogliare

Numero massimo d'applicazioni: 1-2 applicazioni ogni 10-14 giorni dal trapianto

Si consiglia di effettuare una prova di selettività su *Lactuca sativa var. romana* prima dell'impiego.

Melo, Pero - contro Ticchiolatura (*Venturia inaequalis, Venturia pyrina*)

Dose: 150 g di prodotto/hl.

Volume d'applicazione: 1000-1200 l/ha, da adeguare per conseguire una buona copertura fogliare

Numero massimo d'applicazioni: 6 applicazioni, iniziando preventivamente in fase di attiva crescita poi ogni 10-14 giorni Per ottenere una migliore efficacia si consiglia sempre l'associazione con formulati di copertura a base di Mancozeb.

Rispettare la dose massima d'impiego di 8 kg s.a./ha/anno

**COMPATIBILITÀ ALLEATO 80 WG** non è compatibile con formulati a base di rame o a reazione fortemente acida o alcalina e con concimi fogliari contenenti azoto. Non effettuare miscele con formulati oleosi, né irrorare il prodotto su colture che ne siano state precedentemente trattate in quanto si ostacolerebbe la penetrazione del prodotto nella pianta. Si consiglia di effettuare una prova di compatibilità prima di ogni miscela. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

## INTERVALLI DI SICUREZZA

CETRIOLI, ZUCCHINE: 3 GIORNI; UVE: 28 GIORNI; ARANCE, LIMONI, MANDARINI, POMPELMI, MELONI, COCOMERI, LATTUGHE E SIMILI: 15 GIORNI; MELE, PERE: 40 GIORNI

## ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato - Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Da non applicare con mezzi aerei - Operare in assenza di vento - Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Il contenitore non può essere riutilizzato