

FAXER EC

Fungicida endoterapico ad ampio spettro d'azione

Concentrato emulsionabile

MECCANISMO D'AZIONE: FRAC G3

FAXER EC Registrazione del Ministero della Salute n. 17092 del 22/01/2018

COMPOSIZIONE	
Procloraz puro	g 40,7 (= 450 g/l)
Coformulanti q.b. a	g 100
Contiene: Idrocarburi Aromatici, Alcol Benzilico	

Partita n.

Belchim Crop Protection NV/SA

Technologielaan, 7 - 1840 Londerzeel (Belgio)

Tel +32 (0) 52 300906

Stabilimento di produzione:

Phyteurop S.A. - 53 rue Raspail, 92594 Levallois-Perret Cedex (Francia)

Distribuito da

Belchim Crop Protection Italia S.p.A.

Viale Milanofiori, Strada 6, Palazzo N3 - 20089 Rozzano (MI) - Tel. 02 33599422

Contenuto: 1-5-10 L

INDICAZIONI DI PERICOLO: H302 Nocivo se ingerito. H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H318 Provoca gravi lesioni oculari. H332 Nocivo se inalato. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

CONSIGLI DI PRUDENZA:

PREVENZIONE: P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi/il viso. P281 Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.

REAZIONE: P305 + P351 + P338 + P310 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P301 + P310 + P331 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. NON provocare il vomito. P308 + P313 In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali.



PERICOLO

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: Nell'animale da esperimento è irritante delle mucose (lacrimazione, scialorrea, diarrea); deprime il SNC e la respirazione; possibili effetti epatici.

Terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleli.

CARATTERISTICHE

FAXER EC è un fungicida ad ampio spettro, dotato di attività preventiva, curativa ed eradicante.

Presenta azione translaminare e di contatto, risultando efficace contro Septoria (*Septoria tritici*) e Cercospora (*Pseudocercospora herpotrichoides*).

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Fumento (primaverile e invernale), avena, grano duro, triticale, segale:

- contro Cercospora (*Pseudocercospora herpotrichoides*) alla dose di 1 l/ha. Effettuare un solo trattamento l'anno intervenendo tra fine accostamento e secondo nodo, utilizzando volumi d'acqua di 150-500 L/ha.
- contro Septoria (*Septoria tritici*), alla dose di 1 l/ha. Effettuare max. 2 trattamenti l'anno, a distanza di 14 giorni, intervenendo tra levata e fine spigatura, utilizzando volumi d'acqua di 150-500 L/ha.

FAXER EC può essere distribuito con tutti i tipi di attrezzatura.

AVVERTENZE: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre rispettate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici; qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 35 gg prima della raccolta.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

PROTEGGERE DAL GELO